

Keep refrigerated. This formula requires refrigeration to maintain culture viability. Use only if safety seal is intact./ Garder réfrigérer. Cette formule demande une réfrigération pour maintenir la viabilité de la culture. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.

Recommended Use: Helps to reduce the risk of antibiotic-associated diarrhoea and support gastrointestinal health.

Recommended Dose: Adults, adolescents and children (6 years and older): Take 2 capsules 1-2 times daily between meals, at least 2 to 3 hours before or after taking antifungals, or as directed by a healthcare practitioner.

Usage recommandé : Aide à réduire le risque d'être atteint d'une diarrhée associée aux antibiotiques et à soutenir la santé gastrointestinale.

Dose recommandée : Adultes, adolescents et enfants (6 ans et plus) : Prendre 2 capsules 1 à 2 fois par jour entre les repas, au moins 2 à 3 heures avant ou après la prise d'antifongiques, ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé.

Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity./ Il est possible que le contenu ne puisse pas remplir le paquet afin de tenir compte de l'espace requis pour l'étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.



Saccharomyces boulardii

Active probiotic culture
Culture probiotique active

NPN 80030216

Hypoallergenic / Hypoallergénique

60 CAPSULES

Medicinal Ingredients (per capsule): *Saccharomyces boulardii* (CBS 5926) 5 billion CFU.

Non-Medicinal Ingredients: Hypoallergenic plant cellulose, vegetarian capsule (hypromellose, water).

Ingrédients médicinaux (par capsule): *Saccharomyces boulardii* (CBS 5926) 5 milliards d'UFC.

Ingrédients non médicinaux : Cellulose de plante hypoallergénique, capsule végétarienne (hypromellose, eau).

Warning: Do not use if you have an immune-compromised condition. Consult a healthcare practitioner prior to use if you have fever, vomiting, bloody diarrhoea or severe abdominal pain. Stop use and consult a healthcare practitioner if symptoms of digestive upset occur, worsen or persist beyond 3 days.

Avertissement : Ne pas utiliser si vous souffrez d'un déficit immunitaire. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser si vous souffrez de fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante ou de douleurs abdominales intenses. Cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé si des symptômes de troubles digestifs se manifestent, s'aggravent ou persistent au-delà de 3 jours.

Keep out of the reach of children./ Garder hors de la portée des enfants.

Manufactured by / Fabriqué par :

Pure Encapsulations, LLC

Sudbury, MA 01776 USA

Licence holder / Titulaire de la licence :

Pure Encapsulations, LLC

Richmond Hill, ON L4C 0L8

code: **SB6C**



v6