

Protocole de soutien à la désintoxication

MIS AU POINT EN COLLABORATION AVEC D^{RE} PENNY KENDALL-REED, N.D.*



Mis au point par D^{re} Penny Kendall-Reed, N.D.* en collaboration avec Pure Encapsulations^{MD}, le Protocole de soutien à la désintoxication est conçu pour vous aider à fournir les soins et le soutien les plus efficaces pour les voies de désintoxication de vos patients. Des Produits d'autres marques de confiance d'Atrium Innovations telles que Genestra Brands^{MD} ont été ajoutés pour fournir un protocole complet et robuste.

De nombreux patients et médecins ne comprennent pas suffisamment les risques associés à l'utilisation de kits de désintoxication disponibles dans le commerce. Ces options universelles ne tiennent pas compte de la physiologie et de la génétique d'un individu. Les trousseaux standardisés impliquent que tout le monde a besoin de la même stratégie de désintoxication. Nous savons que cela ne s'applique pas à la santé cardiovasculaire, métabolique ou immunitaire, alors pourquoi devrait-il s'appliquer à la désintoxication.

Par conséquent, il est impératif d'évaluer de façon critique la pertinence de ces trousseaux à des fins de désintoxication, car elles améliorent généralement les voies de désintoxication de la phase 1 et de la phase 2. Ce n'est pas idéal pour tout le monde et peut en fait être nuisible.

Phase 1 rapide, Phase 2 lente

Les patients qui présentent des voies de détoxification accélérées de phase 1 peuvent expulser rapidement les toxines des cellules. Cependant, cette vitesse conduit également à une surproduction de substrats de phase 1 inflammatoires et hautement toxiques. Si la détoxification ultérieure de phase 2 est lente, ces substrats hautement toxiques de phase 1 restent dans la circulation sanguine pendant de longues périodes. Par conséquent, les patients peuvent subir des réactions prolongées de désintoxication et faire face à un risque accru d'inflammation et de certains cancers, car les toxines ne sont pas efficacement éliminées de l'organisme.

Phase lente 1, phase rapide 2

Les patients dont la voie de détoxification de phase 1 est lente ne possèdent pas suffisamment d'enzymes CYP450, qui sont essentielles pour une élimination efficace de la toxine des cellules. Par conséquent, les toxines restent dans les cellules pendant de longues périodes, ce qui peut entraîner des dommages importants. Si la détoxification de la phase 2 est rapide, elle éliminera efficacement tous les substrats disponibles de la phase 1. Cependant, avec une phase 1 lente, il y aura moins de substrats pour la phase 2 à évacuer.

Phase lente 1, Phase lente 2

Ces patients sont lents à expulser les toxines des cellules et à les éliminer complètement de l'organisme. Par conséquent, ils peuvent porter un lourd fardeau toxique.

PRINCIPALE PRÉOCCUPATION CLINIQUE ET SYMPTÔMES CHEZ LES PATIENTS	RECOMMANDATION DE PRODUIT	DOSE QUOTIDIENNE	DONNÉES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES
Phase 1 rapide et phase lente 2 : <ul style="list-style-type: none">• L'élimination rapide des médicaments nécessite souvent des doses plus élevées.• Nausées fréquentes dans des environnements pollués ou avec des médicaments.• Inflammation fréquente dans des environnements pollués ou avec des médicaments• Maux de tête fréquents dans des environnements pollués ou avec des médicaments.• Non aggravé par la caféine (tant que les glandes surrénales sont correctes).• Fatigue, surtout à l'effort.• Bouffissure et prise de poids significative malgré un régime alimentaire propre.• Stéatose hépatique ou élévation des enzymes hépatiques malgré un régime alimentaire propre.	Pure Encapsulations ^{MD} CurcumaSorb (Code produit : MCU9C-C) OU Genestra Brands ^{MD} Curcumin Complex (Code produit : 07496)	1 capsule 2 fois par jour sur un estomac vide*	Pour ralentir les voies de phase 1.
	Pure Encapsulations ^{MD} Glutathion liposomal (Code produit : LSG6C-C)	1 gélule 2 fois par jour avec ou sans nourriture	Augmenter la désintoxication de phase 2 et réduire l'inflammation.
	Pure Encapsulations ^{MD} NAC 900 mg (Code produit : NA91C-C) OU Pure Encapsulations ^{MD} NAC + Glycine poudre (Code produit : NGY1C-C)	1 capsule 2 fois par jour sur un estomac vide* 1 cuillère-mesure par jour dans de l'eau sur un estomac vide*	Augmenter la désintoxication de phase 2 et réduire l'inflammation.
	Pure Encapsulations ^{MD} Astaxanthine (Code produit : AST6C-C)	1 gélule 2 fois par jour sur un estomac vide*	Augmenter la détoxification de phase 2 spécifiquement dans les mitochondries.
	Cuire tous les crucifères, éviter la menthe, le chardon Marie, le millepertuis et l'échinacée (tous ces ingrédients augmenteront la désintoxication de la phase 1). Consommez 1 à 2 boissons caféinées par jour selon les surrénales. La caféine ralentit la détox de phase 1 et est anti-inflammatoire pour cette combinaison de détoxification.^{1,2}		
Tests complémentaires : Phase 1 rapide et Phase lente 2 <input type="checkbox"/> Tests génétiques : CYP1A2, CYP3A4, GSTP1, NQ01, SOD2 <input type="checkbox"/> Échographie du foie <input type="checkbox"/> Analyse de sang : Phosphatase alcaline, ALAT, VS, CRP, panel lipidique			

PE-DETOXPRO-0324F

*Sur un estomac vide - 30 minutes ou plus avant de manger ou 2 heures ou plus après.

**Idéalement à 20 h 30 ou plus tôt afin de suivre les rythmes circadiens naturels.

Ces produits ne conviennent pas à tout le monde. Toujours lire et respecter l'étiquette. Pour plus d'informations, contactez-nous.



800.361.0324 | PureEncapsulations.ca

© 2024 Pure Encapsulations. Tous droits réservés.

pure
encapsulations[®]

PRINCIPALE PRÉOCCUPATION CLINIQUE ET SYMPTÔMES CHEZ LES PATIENTS	RECOMMANDATION DE PRODUIT	DOSE QUOTIDIENNE	DONNÉES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES
<p>Phase lente 1 et phase rapide 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflammation tissulaire fréquente – en particulier intracellulaire • Céphalées fréquentes • Fatigue, moins que ci-dessus <ul style="list-style-type: none"> • Nausées retardées • Mauvaise haleine et acné 	<p>Genestra Brands^{MD} D.I.M. (Code produit : 10474)</p> <p>OR</p> <p>Pure Encapsulations^{MD} DIM & Détox (Code produit : DD6C-C)</p>	<p>1 capsule 2 fois par jour sur un estomac vide*</p> <p>2 capsules 2 fois par jour sur un estomac vide*</p>	<p>Augmenter les voies de la phase 1.</p>
	<p>Genestra Brands^{MD} Milk Thistle Tincture (Code produit : 11689)</p>	<p>5 mL 2 fois par jour sur un estomac vide*</p>	<p>Augmenter les voies de la phase 1.</p>
	<p>Pure Encapsulations^{MD} Glutathion liposomal (Code produit : LSG6C-C)</p>	<p>1 gélule par jour avec ou sans nourriture</p>	<p>Particulièrement important dans les environnements pollués pour réduire la charge inflammatoire et augmenter la charge sur les voies de phase 2.</p>
	<p>Pure Encapsulations^{MD} NAC 900 mg (Code produit : NA91C-C)</p> <p>OR</p> <p>Pure Encapsulations^{MD} NAC + Glycine poudre (Code produit : NGY1C-C)</p>	<p>1 capsule 2 fois par jour sur un estomac vide*</p> <p>½ cuillère-mesure par jour dans de l'eau sur un estomac vide*</p>	<p>Particulièrement important dans les environnements pollués pour réduire la charge inflammatoire et augmenter la charge sur les voies de phase 2.</p>
	<p>N'utilisez pas de produits contenant de la curcumine, car ils ralentissent la désintoxication de la phase 1.³ Consommer des crucifères crus, augmenter la menthe et le chardon Marie, utiliser de l'échinacée (tous ces éléments augmenteront la désintoxication de phase 1). Évitez la caféine et la curcumine, car elles ralentissent la désintoxication de phase 1 et augmentent l'inflammation.^{1,2}</p>		
<p>Tests complémentaires : Phase lente 1 et phase rapide 2</p> <p><input type="checkbox"/> Tests génétiques : CYP1A2, CYP3A4, GSTP1, NQ01, SOD2 <input type="checkbox"/> Analyse de sang : Phosphatase alcaline, ALAT, VS, CRP, panel lipidique</p> <p><input type="checkbox"/> Échographie du foie</p>			

*Sur un estomac vide - 30 minutes ou plus avant de manger ou 2 heures ou plus après.
Ces produits ne conviennent pas à tout le monde. Toujours lire et respecter l'étiquette.
Pour plus d'informations, contactez-nous.

PRINCIPALE PRÉOCCUPATION CLINIQUE ET SYMPTÔMES CHEZ LES PATIENTS	RECOMMANDATION DE PRODUIT	DOSE QUOTIDIENNE	DONNÉES ET CONSIDÉRATIONS CLINIQUES
<p>Phase lente 1 et phase lente 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflammation tissulaire fréquente - en particulier intracellulaire. • Nausées fréquentes dans des environnements pollués ou avec des médicaments. • Inflammation fréquente dans des environnements pollués ou avec des médicaments • Maux de tête fréquents dans des environnements pollués ou avec des médicaments. • Gonflement important et prise de poids accrue. <ul style="list-style-type: none"> • Stéatose hépatique ou élévation des enzymes hépatiques, même avec un régime alimentaire propre. 	<p>Genestra Brands^{MD} D.I.M. (Code produit : 10474)</p> <p>OU</p> <p>Pure Encapsulations^{MD} DIM & Détox (Code produit : DD6C-C)</p>	<p>1 capsule 2 fois par jour sur un estomac vide*</p> <p>2 capsules 2 fois par jour sur un estomac vide*</p>	<p>Pour augmenter les voies de la phase 1.</p>
	<p>Genestra Brands^{MD} Milk Thistle Tincture (Code produit : 11689)</p>	<p>5 mL 2 fois par jour sur un estomac vide*</p>	<p>Augmenter les voies de la phase 1.</p>
	<p>Pure Encapsulations^{MD} Glutathion liposomal (Code produit : LSG6C-C)</p>	<p>1 gélule par jour avec ou sans nourriture</p>	<p>Augmenter la désintoxication de phase 2 et réduire l'inflammation.</p>
	<p>Pure Encapsulations^{MD} NAC 900 mg (Code produit : NA91C-C)</p> <p>OU</p> <p>Pure Encapsulations^{MD} NAC + Glycine poudre (Code produit : NGY1C-C)</p>	<p>1 capsule 2 fois par jour sur un estomac vide*</p> <p>½ cuillère-mesure par jour dans de l'eau sur un estomac vide*</p>	<p>Augmenter la désintoxication de phase 2 et réduire l'inflammation.</p>
	<p>Pure Encapsulations^{MD} Astaxanthine (Code produit : AST6C-C)</p>	<p>1 gélule 2 fois par jour sur un estomac vide*</p>	<p>Augmenter la désintoxication de phase 2, en particulier dans les mitochondries.</p>
<p>N'utilisez pas de produits contenant de la curcumine, car ils ralentissent la désintoxication de la phase 1.³ Cuire tous les crucifères, éviter la menthe, le chardon Marie, le millepertuis et l'échinacée (tous ces ingrédients augmenteront la désintoxication de la phase 1). Consommer 1 à 2 boissons caféinées par jour selon les surrénales. La caféine ralentit la détox de phase 1 et est anti-inflammatoire pour cette combinaison de détoxification.^{1,2}</p>			
<p>Tests complémentaires : Phase lente 1 et phase lente 2</p> <p><input type="checkbox"/> Tests génétiques : CYP1A2, CYP3A4, GSTP1, NQ01, SOD2 <input type="checkbox"/> Analyse de sang : Phosphatase alcaline, ALAT, VS, CRP, panel lipidique</p> <p><input type="checkbox"/> Échographie du foie</p>			

RÉFÉRENCES :

1. El-Sohemy A, Cornelis MC, Kabagambe EK, Campos H. Genes Nutr. 2007 Oct;2(1):155-6.
2. Farzaei MH, Zobeiri M, Parvizi F, El-Senduny FF, Marmouzi I, et al. Nutrients. 2018 Jul 1;10(7):855.
3. Muhammad I, Wang H, Sun X, Wang X, Han M, et al. Front Pharmacol. 2018 May 25;9:554.

*Pour référence clinique seulement — non destiné à un usage public. L'information contenue dans le présent document est fournie à des fins d'éducation seulement et elle n'a pas été évaluée par la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance du Canada (DPSNSO). L'information et les produits mentionnés ne sont pas destinés à être utilisés pour le diagnostic, le traitement, la guérison, l'ajournement ou la prévention de maladies. Les doses suggérées sont destinées aux adultes et basées sur l'expérience clinique et il incombe aux professionnels de la santé de bien utiliser l'information pour leurs patients. Veuillez consulter l'étiquette pour trouver les données relatives à la sécurité, les avertissements et les interactions. Toujours lire et suivre l'étiquette. Communiquez avec nous pour plus d'information.